

Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu
ročník 2011 - 2012

MDLOBA	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zpomalení tepu, který je slabě hmatný 2. Výrazná bledost, obličej je pokryt potem. 3. Pocit závratí, potácení, nevolnost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umožnit postiženému lepší prokrvení mozku - tzn. nohy výš než hlava, uvolnit těsný oděv 2. Umožnit přísun čerstvého vzduchu 3. Podání tekutiny
Transport	NE

KŘEČE, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Křeče trvající cca 3 minuty, pěna z úst 2. Rozšířené, na světlo nereagující zornice až bezvědomí 3. Citlivost na lehký tlak, zmatenost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fixovat hlavu, chráníme postiženého před sebepoškozením a poraněním, mezi-čelisti vložíme kapesník, abychom zamezili překousnutí jazyka (oprava 13.9.2011) 2. Uvolníme oděv a zajistíme přísun čerstvého vzduchu 3. Udržíme průchodnost dýchacích cest 4. Přivolat rychlou Záchranou službu. NIKDY SE NESNAŽIT DRŽET RUCE, NOHY NEBO STRKAT NĚCO DO ÚST
Transport	ANO

CIZÍ TĚLESA A PŘEDMĚTY V RANÁCH	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Víme o kontaktu s kouskem dřeva, kovu, skla 2. Zaklíněné cizí těleso může být viditelné 3. Bolestivost a pohmatová citlivost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedná-li se třísku vyjmeme ji pizetou, dezinfikace 2. V případě velkého tělesa nevyndaváme, pouze obložíme gázou a lehce zakryjeme
Transport	<p>NE - jedná-li se o předmět, který lze odstranit pinzetou</p> <p>ANO - v případě velkých předmětů, které nemůžeme odstranit sami</p>

Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu
ročník 2011 - 2012

KLÍŠTĚ	
Příznaky	1. Svědění v místě, kde je klíště zakouslé
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	1. Klíště bychom neměli zamazat krémem nebo olejem. Místo desinfikujeme 2. Klíště kývavým nebo krouživým pohybem za pomoci pinzety odstraníme 3. Po vyndání opět desinfikujeme
Transport	NE

PUCHÝŘE	
Příznaky	1. Vznikají při popáleninách nebo při nevhodném oblečení či obuvi 2. Zarudnutí 3. Tenkostěnná bublina vyplněná tkáňovou tekutinou
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	1. Nepochichujeme 2. Sterilně je překryjeme produšným obvazem nebo polštářkovou náplastí
Transport	NE